FORISK AG

ISCAS FORMICIDAS

FORMICIDA AGRÍCOLA E FLORESTAL

FORISK AG formicida desenvolvido com características exclusivas tornando o produto altamente palatável e atrativo a praga, composto pelo ativo **SULFLURAMIDA**, elimina totalmente o formigueiro de forma eficaz e definitiva, causa efeito dominó gerando resíduo em carcaça e fezes, produto com baixa toxicidade e fácil aplicação.

FORISK AG

Dominus

DOMINUS QUÍMICA LTDA.
www.dominusquimica.com.br
Rua Giacomo Stabile, 7 - Pq. Industrial - 86900-000.
Jandaia do Sul, Paraná - Brasil +55 43 3432 - 9500.
| dominusquimicaoficial | dominusquimica

FORISK AG

FICHA TÉCNICA

Nome comercial: FORISK AG. **Princípio ativo:** SULFLURAMIDA.
Grupo Químico: Sulfonamida fluoroalifática. **Nome Químico:** N-ethylperfluoro-octane-1-sulfonamide.
Nº CAS: 4151-50-2. **Tipo de formulação:** GRANULADO (PELLETS).
Composição:
SULFLURAMIDA.....0,3% p/p
ATRATIVO, DILUENTE SÓLIDO, UMECTANTES E ANTIOXIDANTE.....99,7% p/p
Estado Físico: Sólido (granulado).
Modo de Ação: Sulfluramida é um inseticida de ação lenta. Sulfluramida mata os insetos pelo rompimento do fluxo normal de prótons, usado por suas células de armazenamento de energia, para criar o ATP. Havendo o rompimento das mitocôndrias as reservas energéticas são consumidas provocando a morte dos insetos.
Registrado no MAPA sob nº: 04103.
Apresentação: Embalagem plástica de 500 g, Caixa contendo 40 embalagens de 500 g.
Embalagem plástica de 1 kg, Caixa contendo 20 embalagens de 1 kg.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

GRUPO QUÍMICO: SULFONAMIDA FLUOROALIFÁTICA.
NOME COMUM: SULFLURAMIDA.
ANTÍDOTO: TRATAMENTO SINTOMÁTICO.
TELEFONE PARA EMERGÊNCIA: +55 (43) 3432-9500.

CEATOX: 0800 722 6001

MODO DE USO/APLICAÇÃO:

Identificando a formiga e dimensionamento do formigueiro.
Principal etapa para obter eficiência no manejo é através da identificação da espécie do inseto e da metragem de terra revolvida. Com essas informações, se calcula a quantidade necessária de Forisk-AG para a eliminação. • **Primeiro passo:** identifique e meça o murundum (Identificação do monte de terra solta de um formigueiro). • **Segundo passo:** identifique a espécie a ser eliminada (sauva e quenquém).

Acromyrmex (quenquéns)

Acromyrmex (quenquéns)
Popularmente conhecidas como "quenquéns". Usam folhas e outras partes vegetais para cultivar o fungo que serve de alimento para a colônia. Constroem ninhos subterrâneos, geralmente formados por duas a onze câmaras ligadas entre si por um único canal de saída externa. Na entrada do canal há geralmente um tubo de palha entrelaçada, onde desembocam algumas saídas chamadas de "olheiros". Algumas espécies acumulam montes baixos de terra escavada nas proximidades do ninho, onde frequentemente encontramos também os restos envelhecidos do cultivo do fungo. São consideradas pragas agrícolas, causando sérios danos especialmente a pastagens, cultivos de cana-de-açúcar, eucalipto e jardins ornamentais.

Atta (saúvas, içás ou tanajuras)

Atta (saúvas, içás ou tanajuras)
Popularmente conhecidas como saúvas, içás ou tanajuras. Utilizam folhas, frutos, sementes, galhos e partes de flores para cultivar o fungo do qual se alimentam. Seus ninhos são construídos no solo, podendo ter várias centenas de câmaras subterrâneas, distribuídas em uma profundidade de até oito metros (dependendo da espécie). A arquitetura do ninho facilita a saída de gás carbônico produzido pelas formigas e possibilita a entrada de oxigênio, mantendo o meio interno ventilado. A escavação do ninho e sua limpeza geram um acúmulo de terra (murundum) em torno da colônia com até dois metros de altura e os montes secundários (menores) podem estar espalhados por vários metros em torno do principal. As formigas desse gênero causam consideráveis prejuízos econômicos, afetando a agricultura e a pecuária em diferentes regiões das Américas ao cortarem grandes quantidades de biomassa vegetal em áreas de pastagem, florestas e cultivos comerciais.

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO E BULA

Dominus

DOMINUS QUÍMICA LTDA.
www.dominusquimica.com.br
Rua Giacomo Stabile, 7 - Pq. Industrial - 86900-000.
Jandaia do Sul, Paraná - Brasil +55 43 3432 - 9500.
| dominusquimicaoficial | dominusquimica

FORISK AG

FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO DA ISCA:

Momento da aplicação de FORISK-AG:
A aplicação da Isca formicida Forisk-AG deve ser realizada quando os formigueiros a serem eliminados, em uma determinada área, estejam em plena atividade externa no mesmo período. Saber a hora certa de começar o combate é um fator muito importante. Por isso, se alguns formigueiros cessarem suas atividades devido a chuvas prolongadas, combate inadequado, entrada de máquinas e implementos, ou quaisquer tipos de interferências, aguarde até a maioria deles retomem suas atividades normais. Se houver necessidade de repasse, este deverá ser realizado somente após 60 a 90 dias da primeira aplicação. As aplicações sucessivas, sem respeitar esse intervalo de tempo, podem ocasionar a não aceitação das iscas. Lembre-se: não aplique o produto em dias chuvosos, com ameaça de chuvas ou em solos úmidos. A umidade pode prejudicar o transporte das iscas para o interior do formigueiro, comprometendo assim a eficiência do controle.

ARMAZENAMENTO ADEQUADO:

Armazená-lo em lugar seco, ventilado e coberto, evitando o contato com piso e mantendo-o na embalagem original, fechada. Não armazene junto a outros produtos químicos - como inseticidas, fungicidas, herbicidas e combustíveis - ou produtos que exalem cheiro forte, pois poderão prejudicar sua atratividade.

DIMENCIONANDO A AREA AFETADA PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO:
Para cada m^2 de terra solta, aplicar 8 gramas da Isca Formicida FORISK AG. Por exemplo, se o maior comprimento for 10 metros, e a maior largura for 6 metros, a área total será de 10x6 = 60 m^2. Neste caso serão necessárias 60 doses de 8 gramas, que dará um total de 480 gramas.



LOCAIS IDEAIS PARA APLICAÇÃO DA ISCA:

- Aplicar ao lado do olheiro de alimentação fora do murundum (monte de terra).
- Olheiros de alimentação com formação de carreiros.
- Em olheiros de abastecimento com terra solta, lado contrário de onde as formigas estão retirando a terra.
- Carreiros secundários que se unem a um principal.
- Em olheiros de abastecimento sem terra solta, fazer a aplicação a 20 cm de distância e em qualquer um dos lados.

LOCAIS NÃO INDICADOS PARA APLICAÇÃO:

- Em olheiro de limpeza (ventilação).
- Dentro do olheiro.
- No carreiro primário e secundário.

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO E BULA

Dominus

DOMINUS QUÍMICA LTDA.
www.dominusquimica.com.br
Rua Giacomo Stabile, 7 - Pq. Industrial - 86900-000.
Jandaia do Sul, Paraná - Brasil +55 43 3432 - 9500.
| dominusquimicaoficial | dominusquimica