

FOR-RAT

RATICIDA PÓ

A BASE DE COUMATETRALIL - RATICIDA MULTI DOSE
PÓ HIDRO-REPELENTE COM FRASCO APLICADOR.



FOR RAT PÓ

Raticida com formulação equilibrada e um potente ingrediente ativo, eficaz no controle de ratos em áreas rurais e urbanas. É altamente eficaz no controle de ratos, camundongos e ratazanas, em ambientes externos e internos.

VANTAGENS QUE SÓ O FOR RAT PÓ TEM PARA VOCÊ!

- Pó com ação eletrostática;
- Aplicação fácil e segura;
- Indicada para áreas internas;
- Pó com ação eletrostática e hidro-repelente.

FOR-RAT

RATICIDA PÓ

Dominus

DOMINUS QUÍMICA LTDA.

www.dominusquimica.com.br
Rua Giacomo Stabile, 7 - Pq. Industrial - 86900-000.
Jandaia do Sul, Paraná - Brasil +55 43 3432 - 9500.



dominusquimicaofc



dominusquimica

FOR-RAT

RATICIDA PÓ

FICHA TÉCNICA

Princípio ativo: Cumatetralil. | **Grupo químico:** Cumarínico.
Nome Químico: 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl) coumarin.
Nº CAS: 5836-29-3.

Tipo de formulação: Pó de contato.

Composição:
CUMATETRALIL.....0,7500%; DESNATURANTE.....0,0002%; INGREDIENTES INERTES.....99,2498%.

Estado Físico: Sólido (pó).

Modo de Ação: Anticoagulante. Antagonista da vitamina K, interrompe o ciclo de formação da vitamina K, causando hemorragias. A morte da espécie alvo irá ocorrer entre 3 e 7 dias após a ingestão do produto em volume mínimo suficiente para a contaminação.

Registro no Ministério da Saúde: 33308.0002

Apresentação: Frasco de 1 kg, Caixa contendo 12 unidades de 1 kg.

MODO DE USO / APLICAÇÃO:

Procure o caminho frequente pelos roedores, evitando alterar a disposição dos objetos na área a ser tratada, uma vez notada quaisquer alterações no trajeto habitual dos roedores, os mesmos poderão alterar suas trilhas e caminhos utilizados. Aplique uma camada de aproximadamente 8cm de largura por 1 m de comprimento equidistante de 1 a 2 metros uma aplicação de outra, sobre as superfícies frequentadas pelos roedores. No caso de aplicação em tocas e esconderijos, preferencialmente fazer a aplicação com o auxílio de um polvilhador. A formulação especial de FOR RAT PÓ, torna o produto mais resistente em condições de alta umidade, podendo ser utilizado com eficiência em ambiente internos e externos, urbanos e rurais. Refazer a aplicação enquanto houver atividade dos roedores no ambiente a ser controlado. Após terminada a desratização, recolher as iscas (sobras) dos locais onde foram aplicadas. Ao aplicar o produto, utilize luvas. A quantidade de produto a ser aplicado pode variar de acordo com o nível de infestação. Considerar entre 40 g e 60 g de FOR RAT PÓ por metro linear. No caso de tocas e esconderijos, o volume de aplicação pode variar entre 200 g e 400 g em cada uma, conforme o tamanho das mesmas. Retirar os animais mortos da área de aplicação.

PRECAUÇÕES DE USO:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não comer, beber nem fumar durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Durante o manuseio usar luvas e evitar o contato com a pele, boca e olhos. Não comer, beber nem fumar durante a aplicação. Não aplicar em tubulações de ar ou fontes de ventilação que possibilitem a liberação do rodenticida no ambiente. As mulheres grávidas não podem manipular o rodenticida. Conservar o local desratizado em perfeita condição de limpeza. Não transportar nem armazenar com alimentos nem medicamentos. Produto tóxico para mamíferos, aves e peixes. Não se deve contaminar os cursos de água. Queimar ou enterrar os roedores mortos e eliminar os restos do produto de forma segura. Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais. Usar roupas de mangas longas, luvas de borracha, óculos de proteção ocular e máscara de proteção para gases. Após a aplicação tome banho e troque de roupa. Não misture a roupa contaminada com a de uso diário. O intervalo entre as aplicações é de 15 dias. Reentrada no local somente após 2 horas da aplicação. Modo de eliminação e desativação em caso de derramamento: em caso de derrame acidental, polvilhe farinha ou farelo de trigo úmido com água sobre o local, recolha e coloque em um saco plástico bem fechado, identifique e encaminhe para o instituto ou órgão ambiental da sua região. **PRODUTO DE USO INSTITUCIONAL. APLICAÇÃO EXCLUSIVA POR ENTIDADES ESPECIALIZADAS. O PRODUTO QUANDO UTILIZADO E APLICADO NAS DOSES E FORMAS RECOMENDADAS, NÃO APRESENTA DEMAIS RESTRIÇÕES DE USO.**

PRIMEIROS SOCORROS:

Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou serviço de saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão acidental, não provoque vômito.

TOXICOLOGIA:

DL₅₀ Oral (ratos): >2000 mg/kg

DL₅₀ Dermal (ratos): >2000 mg/kg

Corrosão/Irritação da pele: produto considerado não irritante para pele.

Corrosão/Irritação dos olhos: produto considerado não irritante para os olhos.

Sensibilização: produto considerado não sensibilizante para cobaias.

INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: Cumarínico (Compostos de ação anticoagulante)

Nome Comum: Cumatetralil

Antídoto: Vitamina K1

TELEFONE DE EMERGÊNCIA: + 55 43 3432.9500

CEATOX: 0800 722 6001.



ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

Dominus

DOMINUS QUÍMICA LTDA.

www.dominusquimica.com.br

Rua Giacomo Stabile, 7 - Pq. Industrial - 86900-000.

Jandaia do Sul, Paraná - Brasil +55 43 3432 - 9500.



| dominusquimicaofc



| dominusquimica